



platica sobre tu diabetes tipo 2 con tu médico.

Invokana[®]
canagliflozin tablets

Mantener una conversación abierta y honesta con tu médico es un buen comienzo para controlar tu condición. Si no sabes qué preguntar, esta es una buena herramienta que te podría ayudar.

Aquí te compartimos algunas preguntas para tu próxima cita.

- ¿Cuáles son los números que debo de cuidar?
- ¿Qué es el A1C?
- ¿Estos números están donde deben estar?
- ¿INVOKANA[®] (canagliflozin) puede ayudar a hacer una diferencia en mis números?
- ¿Con qué frecuencia y en qué momento del día debo revisar mi azúcar en la sangre?
- ¿Qué tipo de ejercicio puedo incluir en mi vida?
- ¿Hay ejercicios que debería evitar?
- ¿Es INVOKANA[®] diferente de otros tipos de medicamentos que estoy tomando o que he tomado?
- ¿Cómo afecta INVOKANA[®] mi peso?
- ¿Debería considerar perder peso? Si es así, ¿cuánto?
- ¿Es mejor controlar las porciones o contar los carbohidratos en mi comida?
- ¿Cómo puedo comer saludable cuando no estoy en casa?
- ¿Cómo afecta INVOKANA[®] mi presión arterial?
- ¿Cómo sé si mi medicamento está funcionando?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios de INVOKANA[®]?

Recuerda que además de tener una conversación abierta con tu médico, también deberías:



Tomar tu medicamento.



Comer bien.



Hacer ejercicio.

información importante de seguridad

¿QUÉ ES INVOKANA[®]?

INVOKANA[®] es un medicamento con receta que se combina con dieta y ejercicio para reducir el nivel de azúcar en la sangre en los adultos con diabetes tipo 2. INVOKANA[®] no está indicado para personas con diabetes tipo 1 o con cetoacidosis diabética (aumento de cetonas en la sangre o la orina). Se desconoce si INVOKANA[®] es seguro y efectivo en niños menores de 18 años de edad.

Por favor lee la Información Importante de Seguridad de INVOKANA[®] adicional en las siguientes páginas y la [Información Completa del Producto](#) y la [Guía del Medicamento](#) en es.INVOKANA.com

información importante de seguridad

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

INVOKANA® puede causar efectos secundarios importantes, entre los que se incluyen los siguientes:

- **Deshidratación.** INVOKANA® puede causar deshidratación en algunas personas (la pérdida de demasiada agua en el cuerpo), que puede provocarte mareos, desmayos, aturdimiento o debilidad, especialmente al ponerte de pie (hipotensión ortostática). Es posible que corras más riesgo de sufrir una deshidratación si tienes la presión arterial baja, tomas medicamentos para bajar la presión arterial (incluidos los diuréticos [comprimidos para eliminar líquidos]), estás bajo una dieta con bajo contenido de sodio (sal), tienes problemas renales o tienes más de 65 años de edad.
- **Infección vaginal micótica.** Las mujeres que toman INVOKANA® pueden sufrir infecciones vaginales micóticas. Los síntomas incluyen los siguientes: olor vaginal, secreción vaginal blanca o amarillenta (la secreción puede ser grumosa o tener aspecto de requesón) o picazón vaginal.
- **Infección micótica en el pene (balanitis o balanopostitis).** Los hombres que toman INVOKANA® pueden sufrir infecciones micóticas en la piel alrededor del pene. Los síntomas incluyen: enrojecimiento, picazón o hinchazón del pene, sarpullido en el pene, secreción con olor desagradable en el pene o dolor en la piel alrededor del pene.

Consulta con tu médico qué hacer si tienes síntomas de una infección micótica en la vagina o el pene.

No tomes INVOKANA® en los siguientes casos:

- si eres alérgico a la canagliflozin o a alguno de los ingredientes de INVOKANA®. Las reacciones alérgicas pueden incluir sarpullido, manchas rojas con relieve en la piel (urticaria), hinchazón del rostro, los labios, la lengua y la garganta que puede causar dificultad para respirar o tragar.
- si tienes problemas renales graves o estás en diálisis.

Antes de tomar INVOKANA®, informa a tu médico si tienes problemas renales; de hígado; antecedentes de infecciones urinarias o problemas con la micción; estás bajo una dieta con bajo contenido de sodio (sal); vas a tener una cirugía; estás comiendo menos debido a una enfermedad, cirugía o un cambio en la dieta; problemas con el páncreas; bebes alcohol a menudo (o mucho en periodos cortos de tiempo); has tenido alguna vez una reacción alérgica a INVOKANA®; o tienes otras condiciones médicas.

Avísale a tu médico si estás embarazada o tienes intención de quedar embarazada, o si estás amamantando o planeas hacerlo. INVOKANA® puede afectar al feto. Si quedas embarazada mientras tomas INVOKANA®, avísale a tu médico de inmediato. INVOKANA® puede transmitirse a la leche materna y puede dañar a tu bebé. No amamantes mientras tomas INVOKANA®.

Infórmele a tu médico acerca de todos los medicamentos que tomas, incluyendo los medicamentos con receta y sin receta, las vitaminas y los suplementos herbarios. Especialmente informa a tu médico si tomas diuréticos (comprimidos para eliminar líquidos), rifampina (se usa para tratar o prevenir la tuberculosis), fenitoína o fenobarbital (utilizados para controlar las convulsiones), ritonavir (Norvir®, Kaletra®) (utilizados para tratar la infección por VIH) o digoxina (Lanoxin®) (utilizado para tratar problemas cardíacos).

Posibles Efectos Secundarios de INVOKANA®

INVOKANA® puede causar efectos secundarios importantes, entre los que se incluyen:

- **Cetoacidosis** (aumento de cetonas en la sangre o la orina). **Se ha observado cetoacidosis en personas que tienen diabetes tipo 1 o tipo 2**, durante el tratamiento con INVOKANA®. La cetoacidosis es una condición seria que podría requerir tratamiento en un hospital. La cetoacidosis podría causar la muerte. **La cetoacidosis puede ocurrir con INVOKANA® incluso si tu nivel de azúcar en la sangre es menor a los 250 mg/dl. Deja de tomar INVOKANA® y llama a tu médico de inmediato si tienes alguno de los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, dolor en la zona del estómago, cansancio o dificultad para respirar.**
- **Problemas renales.** Algunas personas que toman INVOKANA® tuvieron una lesión renal repentina. Habla con tu médico de inmediato si: 1) reduces la cantidad de comida o líquido que bebes, si te sientes mal o no puedes comer; 2) comienzas a perder líquido del cuerpo a través de vómitos, diarrea o por estar en el sol demasiado tiempo.
- **Una cantidad alta de potasio en la sangre (hiperpotasemia).**
- **Infecciones graves del tracto urinario:** pueden requerir hospitalización, lo que ha sucedido en personas que toman INVOKANA®. Informa a tu médico si tienes signos o síntomas de una infección en el tracto urinario tales como: sensación de ardor al orinar, necesidad de orinar con más frecuencia o de inmediato, dolor en la parte baja del estómago (pelvis) o sangre en la orina. Algunas personas también pueden tener fiebre alta, dolor de espalda, náuseas o vómitos.
- **Un nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** Si tomas INVOKANA® junto con otro medicamento para reducir el nivel de azúcar en la sangre, como sulfonilurea o insulina, tienes más riesgo de tener niveles bajos de azúcar en la sangre. Es posible que sea necesario reducir la dosis de sulfonilurea o insulina mientras tomas INVOKANA®.

Los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre pueden incluir: dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, mareos, confusión, irritabilidad, hambre, aceleración de los latidos del corazón, sudoración, agitación y nerviosismo.

Reacción alérgica grave. Si tienes algún síntoma de reacción alérgica grave, deja de tomar INVOKANA® y llama a tu médico de inmediato o ve a la sala de emergencias del hospital más cercano.

Huesos Rotos (fracturas óseas): Se han observado fracturas óseas en pacientes que tomaron INVOKANA®. Habla con tu médico acerca de los factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir fracturas óseas.

Los efectos secundarios más comunes de INVOKANA® incluyen: infecciones micóticas vaginales o infecciones micóticas en el pene, cambios en la micción, incluyendo la necesidad urgente de orinar con más frecuencia, en mayores cantidades o durante la noche.

Infórmale a tu médico si tienes algún efecto secundario que te moleste o que no desaparezca. Llama a tu médico para que te asesore sobre los efectos secundarios. Puedes informar los efectos secundarios a la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088. También puedes informar los efectos secundarios a Janssen Scientific Affairs, LLC al 1-800-526-7736.

Por favor consulta la Información Completa del Producto y la Guía del Medicamento en es.INVOKANA.com.

Canagliflozin tiene licencia de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation.

Las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Datos de tu médico

Nombre: _____

Teléfono: _____

Email: _____

Dirección: _____

En caso de emergencia llamar a: _____

Teléfono: _____